



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969025

Telefax: 2610 996664

E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1265/38685

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α υ θ α

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 2833/6902/37761/13.11.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **178/19.11.2020** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 3/2.11.2020 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ. 9/20), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ	Οικονομικός φορέας
180566	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
181695	Κ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
182084	ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
181702	ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
179946	ΜΠΙΜΠΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
179622	Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
181864	HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
182136	ΙΟΝ PLUS ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.
179860	ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
182537	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
182144	ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την **κατακύρωση** του αποτελέσματος της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**» (Αρ. Διακ. 9/20) **στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 9/20 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων για την
«Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»
(Αρ. Διακ.: 9/20)

ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
66	1397-89-3	Amphotericin B, lyophilized 250 µg/mL	50 mL	35,00	4	140,00
106		CD DNA Methylation Bisulfite Kit is specially designed for bisulfite conversion of DNA with a fast and convenient procedure. Based on two-step reaction: CT Conversion, in-column desulphonation, the Kit can easily convert unmethylated cytosines into uracils within only 140min, with starting material 100pg - 2µg, and the recovery efficiency no less than 80%, the unmethylated cytosine conversion efficiency no less than 99%. The purified and converted DNA can be used directly for downstream analyses including endonuclease digestion, sequencing, microarrays, etc. All Kit components are subjected to stringent quality control ensuring the consistency and reproducibility of library preparation.	48 rxns	164,00	1	164,00
190	57-48-7	Fructose, BioUltra, ≥99.0% (HPLC)	250 g	38,02	1	38,02
206	56-40-6	Glycine >99% For electrophoresis	1 Kg	25,00	6	150,00
207	56-40-6	Glycine for Molecular Biology	1X5 Kg	125,00	2	250,00
249		KAPA Hyper Plus Kit(Library preparation, Illumina, 24 rxns), Kit προετοιμασίας βιβλιοθήκης έτοιμης για χρήση σε εφαρμογές αλληλούχησης νέας γενιάς κατάλληλο για μικρά γονιδιώματα (βακτήρια, ιοί), αμπλικόνια και πλασμίδια με μικρό αρχικό όγκο έως και 1ng. Να χρησιμοποιείται τεχνολογία ενζυματικού κατακερματισμού του DNA και προσθήκης ειδικών αλληλουχιών (adapters) σε αντίδραση μέσα στο ίδιο φιαλίδιο. Το kit να περιλαμβάνει αντιδραστήρια για τον ενζυματικό κατακερματισμό του DNA Να περιέχει αντιδραστήρια για την προετοιμασία 24 δειγμάτων. Το τρέξιμο των δειγμάτων να γίνεται σε συσκευές αλληλούχησης νέας γενιάς.	Kit / 24 samples	665,00	3	1.995,00
251		Ki-67 (D3B5) Rabbit mAbΜονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Ki-67 (D3B5), δοκιμασμένο για τεχνικές Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry & Frozen) & Κυτταρομετρίας (F). Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής Ki-67 πρωτεΐνης. Κλώνος D3B5. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο.	20 µL	179,00	1	179,00
261		KLF4 Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για KLF4 δοκιμασμένο στην τεχνική western blot με προτεινόμενη συγκέντρωση 1:1000. Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής LC3B πρωτεΐνης. Κατάλληλο για δείγματα human, mouse, monkey. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol.	40 µL	237,00	1	237,00
289		MEM Vitamin Solution (100x)	10 mL	32,00	2	64,00

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
300		Midori green advance nucleic acid stain Na καθιστά δυνάτη τη χρώση νουκλεϊκών οξέων σε πηκτώματα αгарόζης. Na μην είναι καρκινογόνο και να έχει εξαιρετικά μικρή μεταλλαξικότητα. Na μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. (Na μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Na διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Na διατίθεται ως τουλάχιστον 20.000X σε υδατικό διάλυμα. Na μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση. Na έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Na μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο. Na φθορίζει στο φάσμα του πράσινου.	1 mL	117,80	6	706,80
340		Phospho-Chk1 (Ser345) (133D3) Rabbit mAb (PE Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-Chk1 (Ser345) (133D3) συνδεδεμένο με PE δοκιμασμένο στις τεχνικές Κυτταρομετρίας (F). Na ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της Chk1 πρωτεΐνης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 345. Na είναι κατάλληλο για human, mouse, rat, monkey. Κλώνος 133D3.	100 µL	510,00	1	510,00
341		Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) (D7A5) XP® Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) (D7A5) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοϊστοχημείας (Paraffin), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry) και Κυτταρομετρίας (F). Na ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα του EGF receptor μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένα στην τυροσίνη 1068. Na είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος D7A5. Na παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο.	100 µL	510,00	1	510,00
342		Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) XP® Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry). Na ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της mTOR πρωτεΐνης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 2448. Na είναι κατάλληλο για δείγματα Rat, Chicken, Pig, Horse. Κλώνος D9C2. Na παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο.	100 µL	510,00	1	510,00

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
343		Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody. Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p38 MAPK μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στις θέσεις Thr180 και Tyr182. Να μην αλληλεπιδρά με τις αντίστοιχες φωσφορυλιωμένες θέσεις των SAPK/ JNK και p42/44 MAPK. Να είναι δοκιμασμένο για τις εξής τεχνικές και με προτεινόμενη αραιώση: Western Blotting 1:1000, Ανοσοκατακρήμνιση 1:50, Ανοσοφθορισμός/Ανοσοκυταροχημεία (IF-IC) 1:400. Να είναι κατάλληλο για Human, Mouse, Rat, Monkey, D. melanogaster, Pig, S. cerevisiae. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol.	200 µL	459,60	1	459,60
344		Phospho-p53 (Ser15) (16G8) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού για Phospho-p53 (Ser15) (16G8) συνδεδεμένο με Alexa Fluor® 488 δοκιμασμένο στις τεχνικές Κυτταρομετρίας (F). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p53 πρωτεΐνης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 15 και να μην αλληλεπιδρά με τις p53 που είναι φωσφορυλιωμένες σε άλλες θέσεις. Να είναι κατάλληλο για human. Κλώνος 16G8. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει PBS (pH 7.2), < 0.1% νατραζίδιο & 2 mg/mL BSA.	100 µL	510,00	1	510,00
381		Protease inhibitors cocktail without metal chelators	1 mL	69,76	1	69,76
383	39450-01-6	PROTEINASE K, RECOMBINANT, PCR GRADE	1.25 mL	80,00	2	160,00
387		Rab8A (D22D8) XP® Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελίου κλώνου D22D8 έναντι της Rab8A. Να ανιχνεύει τα ενδογενή συνολικά επίπεδα της Rab8A πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και με προτεινόμενη αραιώση: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:200, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:200. Παρεχόμενο σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο.	20 µL	237,00	1	237,00

A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ
442		Subcloning efficiency DH5a chemically competent E. coli cells. Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are a versatile strain of chemically competent cells that provide a transformation efficiency of > 1 x 10 ⁶ cfu/μg plasmid DNA. Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are an economical solution for routine subcloning procedures or any application where the starting DNA is not limiting. Features of Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells: • Designed for general, everyday use • Contain genetic markers useful for general applications Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells are recommended for routine subcloning of genes into plasmid vectors but are not suitable for the generation of cDNA libraries. These economical cells yield >1 x 10 ⁶ transformants/μg control DNA per 50 μL reaction. Flexible cloning capabilities Subcloning Efficiency™ DH5a™ Competent Cells contain the following genetic markers resulting in these benefits: • lacZΔM15 for blue/white color screening of colonies on plates containing X-gal or Blueo-gal • recA1 ensures increased insert stability and prevents unwanted recombination • endA1 improves the yield and quality of plasmid DNA prepared from minipreps • DH5a™ competent cells support replication of M13mp vectors but do not support plaque formation Genotype: F- Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ-	2 ml (4 x 0.5 mL)	72,00	1	72,00
477	77-86-1	TRIS >99.8% Electrophoresis purity reagent	1 Kg	44,00	1	44,00
478	77-86-1	TRIS ULTRAPURE FOR BUFFER SOLUTIONS	1 Kg	44,00	8	352,00
479	77-86-1	TRIS Ultrapure, electrophoresis reagent	1 Kg	44,00	4	176,00
480		TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER (10x)	1 L	52,48	3	157,44
491		UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v) is used in the purification of nucleic acids. This reagent consists of highly pure chloroform, isoamyl alcohol, and UltraPure™ Phenol saturated with Tris-HCl. When mixtures are extracted with Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol, proteins are denatured and collected in the organic phase or at the interphase, while nucleic acids remain in the aqueous phase. UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol contains no preservatives. It is packaged under an inert gas in shatter-resistant, plastic-coated amber bottles.	400 mL	135,68	1	135,68
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

				ΦΠΑ		
501		α-Tubulin Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα α-Τουμπουλίνης που έχει παραχθεί σε κουνέλι, ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης της α-τουμπουλίνης και να μην εμφανίζει διασταυρούμενη αλληλεπίδραση με την ανασυνδυασμένη β-τουμπουλίνη. Κατάλληλο για δείγματα: Ανθρώπου, Ποντικού, Αρουραίου, Πιθήκου, D. melanogaster, Βοοειδούς. Κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και συνιστώμενες αραιώσεις: Western Blotting (1:1000), Immunohistochemistry (Paraffin) (1:50), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) (1:25), Flow Cytometry (1:25) Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% γλυκερόλη. Παρεχόμενο σε συσκευασία των 100µL κατάλληλη για 10 western blots.	100 µL	317,00	1	317,00
506		β-Actin (13E5) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού έναντι της β-Actin. Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της Total β-Actin και να μην αλληλεπιδρά με α-σκελετικές, α-καρδιακές, α-αγγειακές λείες ή γ-εντερικές λείες μυϊκές ισομορφές. Ως ανοσογόνο να έχει χρησιμοποιηθεί ένα συνθετικό πεπτιδίο που αντιστοιχεί στα αμινοξικά κατάλοιπα κοντά στο αμινοτελικό άκρο της b-actin πρωτεΐνης του ανθρώπου. Να αναγνωρίζει τους αντίστοιχους αντιγονικούς επιτόπους του ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, πιθήκου, βοείου και γουρουνιού. Να είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοϊστοχημείας (IHC-Paraffin), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry) και κυτταρομετρίας ροής (F). Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο.	100 µL	410,95	1	410,95
509		Διάλυμα λύσης ερυθρών για απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων Πυκνό διάλυμα 10x	100 mL	88,80	4	355,20
A/A	CAS NUMBER	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης (ζητούμενη συσκευασία)	Τιμή μονάδας μέτρησης (ζητούμενης συσκευασίας) σε € χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο σε € χωρίς ΦΠΑ

511	Διάλυμα τρυψίνης-EDTA 1X σε PBS χωρίς Ασβέστιο και Μαγνήσιο, χωρίς PhenolRed Trypsin EDTA 1X σε PBS χωρίς Ca, Mg, Phenol Red, pH 7.1 ± 0.3, 280 mOsm/kg ± 10 %. Να έχει ελεγχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. Να έχει δοκιμαστεί για αποκόλληση κυττάρων με την κυτταρική σειρά L929. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες.	FL/500 mL	45,00	6	270,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	9.180,45
					ΦΠΑ 24%	2.203,31
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	11.383,76